

略語一覧

| | |
|---------------|--|
| % CGR | % creatinine generation rate(%クレアチニン産生速度) |
| ABPM | ambulatory blood pressure monitoring(自由行動下血圧測定) |
| AC | arm circumference(上腕周囲長) |
| ACEI | angiotensin-converting-enzyme inhibitor(アンジオテンシン変換酵素阻害薬) |
| AMA | arm muscle area(上腕筋面積) |
| AMC | arm muscle circumference(上腕筋周囲長) |
| ANP | atrial natriuretic peptide(心房性ナトリウム利尿ペプチド) |
| ARB | angiotensin II receptor blocker(アンジオテンシン II 受容体拮抗薬) |
| β_2 -MG | β_2 -microglobulin(β_2 -ミクログロブリン) |
| BIA | bioelectric impedance analysis(生体インピーダンス法) |
| BMI | Body Mass Index(体格指数) |
| CAPD | continuous ambulatory peritoneal dialysis(連続携行式腹膜透析) |
| Ccr | creatinine clearance(クレアチニンクリアランス) |
| CKD | chronic kidney disease(慢性腎臓病) |
| CNS | <i>coagulase-negative staphylococci</i> (コアグラーゼ陰性ブドウ球菌) |
| COI | conflict of interest(利益相反) |
| CPG | clinical practice guideline(診療ガイドライン) |
| CQ | clinical question(クリニカルクエスチョン・臨床疑問) |
| CRP | C-reactive protein(C反応性蛋白) |
| DEXA | dual-energy X-ray absorptiometry(二重エネルギーX線吸収測定法) |
| EAPOS | European Automated Peritoneal Dialysis Outcome Study |
| ECF | extracellular fluid(細胞外液) |
| eGFR | estimated glomerular filtration rate(推算糸球体濾過値) |
| EKR | equivalent urea renal clearance(腎相当尿素クリアランス) |
| EPDWG | European Paediatric Dialysis Working Group |
| EPS | encapsulation peritoneal sclerosis(被囊性腹膜硬化症) |
| ERA-EDTA | European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association(ヨーロッパ腎臓学会) |
| ESA | erythropoiesis stimulating agent(赤血球造血刺激因子製剤) |
| ESBLs | extended-spectrum β -lactamases(基質特異性拡張型 β ラクタマーゼ) |
| ESH | European Society of Hypertension(ヨーロッパ高血圧学会) |
| Fast PET | frequently and short time peritoneal equilibration test(簡易腹膜平衡試験) |
| GDPs | glucose degradation products(ブドウ糖分解物質) |
| GFR | glomerular filtration rate(糸球体濾過量) |
| GNRI | geriatric nutritional risk index(栄養関連指標) |
| GRADE | Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation |
| HD | hemodialysis(血液透析) |
| ICF | intracellular fluid(細胞内液) |
| IL-6 | interleukin-6(インターロイキン-6) |

| | |
|---------|--|
| IPPR | The International Pediatric Peritonitis Registry(国際小児腹膜炎レジストリ) |
| ISPD | International Society for Peritoneal Dialysis(国際腹膜透析学会) |
| JSDT | The Japanese Society for Dialysis Therapy(日本透析医学会) |
| K/DOQI | Kidney Disease Outcomes Quality Initiative |
| LBM | Lean Body Mass(除脂肪体重) |
| LVMI | left ventricular mass index(左室心筋重量係数) |
| MD | mean difference(平均値差, 統計量平均値差) |
| MNA | mini nutritional assessment(簡易栄養状態評価表) |
| MRSA | Methicillin-resistant <i>Staphylococcus aureus</i> (メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) |
| MTAC | over-all mass transfer area coefficient(総括物質移動・膜面積係数) |
| MUST | malnutrition universal screening tool |
| NAPRTCS | North American Pediatric Renal Trials and Collaborative Studies |
| NECOSAD | Netherlands Cooperative Study on the Adequacy of Dialysis |
| NICE-GL | National Institute for Health and Care Excellence-Guideline |
| nPCR | normalized protein catabolic rate(標準化蛋白異化率) |
| nPNA | normalized protein nitrogen appearance(標準化蛋白窒素出現量) |
| PCR | protein catabolic rate(蛋白異化率) |
| PD | peritoneal dialysis(腹膜透析) |
| PDOPPS | Peritoneal Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study(腹膜透析アウトカムと実践パターン研究) |
| PET | peritoneal equilibration test(腹膜平衡試験) |
| PWAT | peritoneal wall anchor technique(腹膜壁アンカー技術) |
| QOL | quality of life(生活の質) |
| RCT | randomized controlled trial(無作為化比較試験) |
| RRF | residual renal function(残存腎機能) |
| SGA | subjective global assessment(主観的包括的評価) |
| SMAP法 | Stepwise initiation of peritoneal dialysis using Moncrief and Popovich technique (段階的腹膜透析導入法) |
| SMD | standardized mean difference(標準化平均値差, 統計量標準化平均値差) |
| SR | systematic review(システムティックレビュー) |
| TSF | triceps skinfold thickness(上腕三頭筋皮下脂肪厚) |
| VEGF | vascular endothelial growth factor(血管内皮増殖因子) |
| VRE | <i>vancomycin-resistant Enterococci</i> (バンコマイシン耐性腸球菌) |