

2022年1月14日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会  
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勲  
副委員長 山川智之  
副委員長 竜崎崇和  
副委員長 南学正臣

## 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2022年1月13日16時 時点)

時点 患者数 地区	12/2	12/9	12/16	12/23	12/30	1/6	1/13		
	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	183	183	183	183	183	183	183	16	79
東北	37	37	37	37	37	37	37	17	9
北関東	104	104	104	104	104	104	104	46	12
南関東 (東京除く)	490	490	490	490	490	490	493	234	76
東京	653	654	656	656	656	656	661	250	83
甲信越・北陸	54	54	54	54	54	54	58	18	11
東海 (愛知除く)	98	98	98	98	98	98	98	34	20
愛知	124	124	124	124	124	124	124	50	17
近畿 (大阪除く)	202	202	202	202	202	202	202	99	25
大阪	263	263	263	263	263	263	266	84	36
中国	94	94	94	94	94	94	95	17	9
四国	23	23	23	23	23	23	23	11	3
九州・沖縄 (福岡除く)	153	154	154	154	154	155	155	57	8
福岡	193	193	193	194	194	194	194	81	38
合計	2671	2673	2675	2676	2676	2677	2693	1014	426

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島  
北関東 茨城・栃木・群馬  
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川  
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野  
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重  
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山  
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口  
四国 徳島・香川・愛媛・高知  
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

## 患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	1253	426	1014	2693
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	32	5	6	43
ワクチン1回接種・患者数	49	8	31	88
ワクチン2回接種・患者数	131	12	87	230
ロナプリーブ投与・患者数	128	6	20	154

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	33	10

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	56	236	458	555	702	561	125	2693
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	1	7	11	12	3	7	2	43
転帰不明者数(入院中含む)	17	79	180	209	252	170	107	1014
退院・隔離解除数	39	146	251	285	302	219	11	1253
死亡者数	0	11	27	61	148	172	7	426
致死率(%)	0.0	4.7	5.9	11.0	21.1	30.7	5.6	15.8
致死率(%) (転帰不明者除く)	0.0	7.0	9.7	17.6	32.9	44.0	38.9	25.4

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1776	774	143	2693
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	31	10	2	43

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	266	845	581	298	142	158	403	2693
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	10	21	7	1	0	0	4	43

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1116	427	301	323	526	2693
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	12	14	3	8	6	43

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1865	443	385	2693
咳嗽	1241	1004	448	2693
咽頭痛	465	1656	572	2693
頭痛	260	1839	594	2693
鼻汁	345	1788	560	2693
嘔気・嘔吐	194	1966	533	2693
下痢	274	1896	523	2693
嗅覚味覚異常	160	1788	745	2693

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	809	529	809	546	2693
胸部CT	1191	305	703	494	2693

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	904	1203	586	2693
呼吸機器の有無	215	1813	665	2693
ECMOの有無	15	1992	686	2693

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	365	1579	749	2693
デキサメタゾン(デカロン)	789	1125	779	2693
トシリズマブ(アクテムラ)	89	1855	749	2693
ファビピラビル(アビガン)	462	1481	750	2693
シクレソニド(オルベスコ)	139	1797	757	2693

酸素飽和度（COVID-19 診断時）

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエラー)	51	88	109	538	786
患者数(酸素投与あり)	12	16	26	37	91

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	14	58	123	226	268	689

尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	69	387	234	38	4	732

クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	35	242	269	130	59	735

CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	212	280	140	71	61	764

白血球数(/ $\mu$ L)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	86	636	45	11	6	784

ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	58	79	195	213	229	774

血小板数(万/ $\mu$ L)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	142	459	140	15	19	775

ワクチン2回接種後感染患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	0	9	36	44	83	58	0	230
退院・隔離解除数	0	6	17	26	48	34	0	131
死亡者数	0	0	0	0	6	6	0	12

ロナブリーブ投与患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	5	16	44	27	41	21	0	154
退院・隔離解除数	5	13	38	24	32	16	0	128
死亡者数	0	0	0	0	3	3	0	6